



DATOS: VIH/SIDA EN MÉXICO, AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y EL MUNDO

VIH/SIDA EN MÉXICO¹

- La prevalencia en adultos es baja en México (0.3%), con 180,000 personas de 15 años en adelante con VIH/SIDA a finales de 2005. La cifra de niños mexicanos con VIH/SIDA no está disponible.
- Se cree que el sexo entre hombres es la causa de más de la mitad (57%) de las infecciones de VIH registradas hasta la fecha en México.²
- Aproximadamente el 23% (42,000) de las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) en México son mujeres y esto es un signo de que la transmisión heterosexual del VIH está incrementándose en la medida en que más mujeres son infectadas por sus parejas.
- La prevalencia del VIH entre usuarios de drogas inyectables y trabajadores sexuales es más alta que la tasa de prevalencia nacional de VIH. Algunos estudios muestran tasas de VIH de 4% y 6% en estos grupos, respectivamente.
- Durante el 2005 se estima que murieron 6,200 mexicanos de enfermedades relacionadas con el SIDA.
- En diciembre de 2005, un número estimado de 31,000 PVVS estaban recibiendo tratamiento antiretroviral en México. Esta cifra representa el 71% de un total estimado de 43,000 personas que necesitaban ese tipo de cuidado.

VIH/SIDA EN AMÉRICA LATINA³ Y EL CARIBE

- Al final de 2007, un estimado de 230,000 personas en el Caribe viven con el VIH, incluyendo a 17,000 personas que contrajeron la infección en 2007.⁴
- El Caribe es la segunda región en el mundo con mayor afectación por el VIH (después de África sub-sahariana) con una prevalencia de 1% en Barbados, República Dominicana y Jamaica; 2% en Bahamas, Guyana y Trinidad Tobago, y más del 3% en Haití. Cuba, sin embargo, tiene una prevalencia de solamente 0.2%.⁵
- En América Latina se estima que 1.6 millones de personas viven con VIH/SIDA.⁴
- Durante el 2007, aproximadamente 58,000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en América Latina.⁴
- Un estimado de 100,000 personas han contraído la infección de VIH en América Latina en 2007.⁴
- Entre las personas de 15 y 24 años de edad, se estima que un 0.4% de mujeres y un 0.6% de hombres en América Latina vivían con VIH en 2005.

- Argentina, Brasil y Colombia son los países con mayores epidemias en la región, en principio debido a sus grandes poblaciones. Brasil posee más de un tercio de todas las PVVS en América Latina.
- A pesar de su población relativamente pequeña, las tasas más altas de prevalencia de VIH se encuentran en Belice, Guatemala y Honduras — donde aproximadamente el 1% de los adultos o más estaban infectados con VIH a finales de 2003.
- La prevalencia del VIH entre los hombres que tienen sexo con hombres oscila entre el 2% y el 28% en diferentes áreas, mientras que los estudios de prevalencia femenina entre trabajadoras sexuales muestran una tasa de 0% al 6.3%. Los usuarios de drogas inyectables son también conductores de la epidemia en América Latina.
- Alrededor de 345,000 personas estaban recibiendo terapia antiretroviral en América Latina en Junio de 2006 – representando el 75% de un estimado de 460,000 personas necesitadas de dicho tratamiento.⁶
- El acceso a la terapia antirretroviral en América Latina ha crecido considerablemente gracias a programas en varios países, incluidos Argentina, Brasil y México. Las tasas de cobertura de Latinoamérica, comparadas con las de otros países de ingreso medio y bajo, ostentan los niveles más altos (75%, comparada con el 23% en el África Sub-Sahariana África y 16% en el Este, Sur y Sudeste Asiático).^{5, 6} Sin embargo, el tamaño total de la epidemia es menor en Latinoamérica que en estas regiones.

DATOS GLOBALES DE VIH/SIDA⁷

- Al final del 2007, un estimado de 33.2 millones de personas vivían con VIH/SIDA.⁴
- Un estimado de 2.5 millones de personas se infectaron con VIH en el mundo en 2007.⁴
- En el mismo año, 2.1 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA.⁴
- El Sur de África continúa siendo el epicentro global de la epidemia. Cerca de dos tercios de todas las personas con VIH, viven en la África sub-Sahariana (62% o 24.7 millones).
- En junio de 2006, un estimado de 1,650,000 personas con VIH/SIDA estaban recibiendo tratamiento en países de ingreso medio y bajo. Si bien se ha logrado un progreso importante en los últimos años, este número sólo representa el 24% de un estimado de 6.8 millones de personas que necesitan tratamiento.^{5, 6}

SOBRE AIDS 2008

La Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 2008) es el foro sobre VIH/SIDA más grande e importante del mundo, y tendrá lugar en la ciudad de México entre el 3 y el 8 de Agosto de 2008. Se esperan 20,000 participantes en AIDS 2008, que será la primera Conferencia Internacional sobre el SIDA que se realice en América Latina. Se espera que la misma incremente la conciencia respecto de la enfermedad y su impacto en toda la región.

Para más información visite www.aids2008.org.

Organizadores de AIDS 2008: Sociedad Internacional de SIDA (IAS), Gobierno Federal de México, Gobierno de la Ciudad de México, Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) -- incluyendo a sus co-patrocinadores la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos --, Consejo Internacional de Organizaciones con Servicio en SIDA (ICASO), Red Global de Personas Viviendo con VIH/SIDA (GNP+)/Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW), YWCA Mundial, Red Asiática de Reducción de Daño (AHRN)

Nota: Los datos estadísticos proporcionados en este documento son los disponibles hasta el momento. Como su actualización es constante, los invitamos a consultar la página del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA o UNAIDS por sus siglas en inglés): www.unaids.org

Fuentes:

¹ A menos que se especifique lo contrario, todos los datos sobre México provienen del Perfil de País del Programa Conjunto de Naciones Unidas (ONUSIDA) que se puede consultar online en:

http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/mexico.asp

Acceso: 14 de marzo de 2007.

² ONUSIDA/OMS, Hoja de Datos del VIH en América Latina. Consultada vía online el 16 de noviembre de 2007 en: http://data.unaids.org/pub/EpiReport/2006/20061121_epi_fs_la_en.pdf

³ A menos que se especifique lo contrario, los datos sobre América Latina provienen del Perfil Regional de ONUSIDA que se puede consultar en: http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Regions/LatinAmerica.asp
Acceso: 14 de marzo de 2007.

⁴ ONUSIDA/OMS, AIDS Epidemic Update 2007, noviembre 20 de 2007.

⁵ ONUSIDA. Perfil Regional Online: http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Regions/Caribbean.asp
Acceso: 16 de noviembre de 2007.

⁶ Organización Mundial de la Salud (OMS), [Toward Universal Access by 2010](#): Cómo está trabajando la OMS con los países para lograr extender la prevención, tratamiento, cuidado y apoyo del VIH (2006).

⁷ ONUSIDA/OMS, Resumen Global de la Epidemia de SIDA en [2006 AIDS Epidemic Update](#) (Diciembre 2006).